



SR EN ISO 9001:2008
Nr. 118-6510246



SR EN ISO 14001:2005
Nr. 119-6510246



SR OHSAS 18001:2008
Nr. 120-6510246



SR ISO/CEI 27001:2006
Nr. 121-6510246

J 02/1566/1994
RO 6510246
RAIFFEISENBANK
AGENTIA ARAD
RO96RZBR0000060011394807
TREZORERIA ARAD
RO86TREZ0215069XXX007250

S.C. TERRA INTERNATIONAL S.R.L.

310182, ARAD, BULEVARDUL GENERAL VASILE MILEA, NR. 6
TELEFON-FAX : 0257/270594, 0357/421020, 0257/253191; MOBIL : 0745776602;
www.terra-international.eu; e-mail : office@terra-international.eu

DESCRIEREA SPECIILOR DE ARBORI

DENUMIREA LUCRARII: REGISTRUL LOCAL AL SPATIILOR VERZI

AMPLASAMENTE: INTRAVILANUL ORASULUI CHISINEU-CRIS

INTRAVILANUL LOCALITATII NADAB

BENEFICIAR: ORASUL CHISINEU-CRIS

PRESTATOR: SC TERRA INTERNATIONAL SRL

CUPRINS

Denumirea științifică	Denumirea populară	Pagina
<i>Abies alba</i> Mill.	Brad	5
<i>Abies concolor</i> (Gordon) Lindl. ex Hildebr.	Brad argintiu	5
<i>Acer campestre</i> L.	Jugastru	5
<i>Acer negundo</i> L.	Arțar american	6
<i>Acer palmatum</i> Thunb. ' Atropurpureum '	Arțar japonez cu frunza roșie	6
<i>Acer platanoides</i> L.	Arțar, Paltin de câmp	6
<i>Acer platanoides</i> L. ' Columnare '	Paltin de câmp columnar	7
<i>Acer platanoides</i> L. ' Crimson King '	Paltin de câmp cu frunza roșie	7
<i>Acer platanoides</i> L. ' Globosum '	Paltin de câmp globulos	7
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Paltin de munte, Paltin	8
<i>Acer saccharinum</i> L.	Arțar argintiu	8
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Castan porcesc, Castan sălbatic	8
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Cenușer	9
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Albiție, Arbore de mătase	9
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Amorfă, Salcâm pitic	9
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Dracilă japoneză	10
<i>Berberis verna</i> C.K.Schneid.	Dracilă sempervirentă	10
<i>Betula pendula</i> Roth	Mesteacăn	10
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Cimișir, Buxus	11
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Trâmbiță, Luleaua turcului	11
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castan comestibil	11
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Catalpă	12
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter ' Nana '	Catalpă globuloasă	12
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Sâmbovină americană	12
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	Gutui japonez	13
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl.	Chiparos de California	13
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Alumii '	Chiparos de California albăstrui	13
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Columnaris Glauca '	Chiparos de California columnar	14
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Ellwoodii '	Chiparos de California compact	14
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Ellwoodii Gold '	Chiparos de California compact auriu	14
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Globosa '	Chiparos de California globulos	15
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. ' Lutea '	Chiparos de California auriu	15
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	Chiparos de Sawara	15
<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	Clerodendron, Floarea norocului	16
<i>Cornus alba</i> L. ' Sibirica '	Sânger siberian	16
<i>Cornus mas</i> L.	Corn	16
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sânger	17
<i>Corylus avellana</i> L.	Alun comun, Alun	17
<i>Corylus colurna</i> L.	Alun turcesc	17
<i>Corylus maxima</i> Mill.	Alun	18
<i>Cotinus coggygria</i> Scop. ' Royal Purple '	Scumpie cu frunze roșii	18
<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid. ' Skogholm '	Cotoneaster târător	18
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Păducel	19
<i>Crataegus monogyna</i> (L.) Jacq.	Păducel	19
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	Chiparos de Arizona	19
<i>Cupressus × leylandii</i> A.B.Jacks. & Dallim.	Chiparos hibrid	20
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartv. ' Goldcrest '	Chiparos	20

<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Gutui	20
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Deuție	21
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Sălcioară	21
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Moșmon japonez	21
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Salbă moale	22
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Salbă târătoare	22
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Salbă japoneză	22
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. 'Aureovariegatus'	Salbă japoneză variegată	23
<i>Ficus carica</i> L.	Smochin	23
<i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i> Zabel	Forsiția hibridă	23
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Forsiția, Clopoțel galben, Ploaie de aur	24
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frasin american	24
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frasin	24
<i>Fraxinus excelsior</i> L. 'Aurea'	Frasin auriu	25
<i>Fraxinus ornus</i> L. 'Meczek'	Mojdrean globulos	25
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginco, Arborele pagodelor	25
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Glădiță, Plătică	26
<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K.Koch	Roșcov de Canada	26
<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Hamamelis	26
<i>Hedera helix</i> L.	Iederă	27
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Zămoșiță	27
<i>Juglans cinerea</i> L.	Nuc cenușiu	27
<i>Juglans regia</i> L.	Nuc	28
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Ienupăr chinezesc	28
<i>Juniperus communis</i> L.	Ienupăr comun	28
<i>Juniperus communis</i> L. 'Hibernica'	Ienupăr comun columnar	29
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	Ienupăr orizontal	29
<i>Juniperus</i> × <i>media</i> Van Melle. 'Pfitzeriana Aurea'	Ienupăr auriu	29
<i>Juniperus</i> × <i>media</i> Van Melle. 'Pfitzeriana Glauca'	Ienupăr	30
<i>Juniperus sabina</i> L. 'Tamariscifolia'	Cetină de negi	30
<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg.	Ienupăr argintiu	30
<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. 'Skyrocket'	Ienupăr rachetă	31
<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex D.Don 'Blue Carpet'	Ienupăr târător	31
<i>Juniperus virginiana</i> L.	Ienupăr de Virginia	31
<i>Juniperus virginiana</i> L. 'Spartan'	Ienupăr de Virginia compact	32
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Keria	32
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Koelreuteria, Clocotiș chinezesc	32
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Kolkwitia	33
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Salcâm galben	33
<i>Larix decidua</i> Mill.	Larice, Zadă	33
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Lemn câinesc japonez	34
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. 'Aureum'	Lemn câinesc japonez cu frunze aurii	34
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Lemn câinesc	34
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Arborele de Ambră	35
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Arbore lealea	35
<i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. & J.Paxton	Caprifoi mirositor	35
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Mâna Maicii Domnului, Caprifoi japonez	36
<i>Lonicera ligustrina</i> Wall. var. <i>yunnanensis</i> Franch.	Loniceră	36
<i>Lycium barbarum</i> L.	Gărdurariță, Cătină de garduri	36
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	Maclură	37

<i>Magnolia denudata</i> Desr.	Magnolie	37
<i>Magnolia kobus</i> DC.	Magnolie	37
<i>Magnolia × soulangeana</i> Soul.-Bod.	Magnolie	38
<i>Magnolia stellata</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	Magnolie stelată	38
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie	38
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Măr siberian	39
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Măr	39
<i>Malus floribunda</i> Siebold ex Van Houtte	Măr ornamental	39
<i>Mespilus germanica</i> L.	Moșmon	40
<i>Morus alba</i> L.	Dud, Dud alb, Frăgar	40
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	Paulovnia, Arborele prințesei	40
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Iasomie, Lămâiță	41
<i>Photinia × fraseri</i> Dress 'Red Robin'	Photinia	41
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	Molid	41
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss 'Conica'	Molid conic	42
<i>Picea omorika</i> (Pancic) Purk.	Molid sârbesc	42
<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Molid argintiu	42
<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Glauc Globosa'	Molid argintiu pitic globulos	43
<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold	Pin negru	43
<i>Pinus strobus</i> L.	Pin strob, Pin neted	43
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin silvestru, Pin comun	44
<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	Platan	44
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Biotă, Arborele vieții	44
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 'Aurea Nana'	Biotă pitică aurie	45
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 'Pyramydalis Aurea'	Biotă aurie	45
<i>Populus alba</i> L.	Plop alb	45
<i>Populus × canadensis</i> Moench	Plop euroamerican	46
<i>Populus nigra</i> L.	Plop negru	46
<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	Plop negru piramidal	46
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Cireș	47
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Cais	47
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Corcoduș	47
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii'	Corcoduș roșu	48
<i>Prunus cerasus</i> L.	Vișin	48
<i>Prunus domestica</i> L.	Prun	48
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb.	Migdal	49
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurocireș	49
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Vișin turcesc	49
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Piersic	50
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 'Purpurea'	Piersic roșu	50
<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Cireș japonez	50
<i>Prunus spinosa</i> L.	Porumbur	51
<i>Prunus triloba</i> Lindl.	Cireș japonez pitic	51
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco var. <i>menziesii</i>	Duglas verde	51
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco var. <i>glauca</i> (Beissn.) Franco	Duglas brumăriu	52
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Piracanta	52
<i>Pyrus communis</i> L.	Păr	52
<i>Quercus cerris</i> L.	Cer	53
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Gorun	53
<i>Quercus robur</i> L.	Stejar, Stejar pedunculat	53

<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Stejar columnar	54
<i>Quercus rubra</i> L.	Stejar roșu	54
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spinul cerbului, Voniceriu	54
<i>Rhus typhina</i> L.	Oțetar	55
<i>Rhus typhina</i> L. 'Dissecta'	Oțetar laciniat	55
<i>Ribes aureum</i> Pursh	Coacăz auriu, Cuișor	55
<i>Ribes nigrum</i> L.	Coacăz negru	56
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Salcâm	56
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. 'Bessoniana'	Salcâm globulos	56
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. 'Umbraculifera'	Salcâm umbrelă	57
<i>Robinia viscosa</i> Vent.	Salcâm roșu	57
<i>Rosa canina</i> L.	Măceș	57
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Trandafir chinezesc	58
<i>Salix alba</i> L.	Salcie albă	58
<i>Salix babylonica</i> L.	Salcie pletoasă	58
<i>Salix caprea</i> L.	Salcie căprească	59
<i>Salix caprea</i> L. 'Pendula'	Salcie căprească plângătoare	59
<i>Salix cinerea</i> L.	Zălog	59
<i>Salix fragilis</i> L.	Salcie plesnitoare	60
<i>Salix integra</i> Thunb. 'Hakuro-nishiki'	Salcie flamingo	60
<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	Salcie creață	60
<i>Salix viminalis</i> L.	Răchită	61
<i>Sambucus nigra</i> L.	Soc negru	61
<i>Spiraea × bumalda</i> Burv.	Cununiță cu flori roz	61
<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zabel	Cununiță	62
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Salcâm japonez	62
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Hurmuz, Cărmâz	62
<i>Syringa josikaea</i> J.Jacq. ex Rchb.f.	Liliac transilvănean	63
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Liliac, Iorgovan	63
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Cătină roșie	63
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Chiparos de baltă	64
<i>Taxus baccata</i> L.	Tisă	64
<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T.G.Hartley	Evodie, Arborele de miere	64
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Tuie	65
<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Danica'	Tuia globuloasă pitică	65
<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don	Tuie gigantică	65
<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don 'Aurea'	Tuie gigantică aurie	66
<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don 'Zebrina'	Tuie gigantică variegată	66
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tei pucios, Tei cu frunza mică	66
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tei cu frunza mare	67
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Tei argintiu	67
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Velniș, Vânj	67
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulm de câmp	68
<i>Ulmus pumila</i> L. 'Turkestan'	Ulm de Turkestan	68
<i>Viburnum opulus</i> L.	Călin	68
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A.DC.	Weigela	69
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	Glicină	69
<i>Yucca</i> spp.	Iuca	69

***Abies alba* Mill.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Abies alba</i> Mill.	Brad	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, spontan la noi în țară. Prezintă frunze aciculare, persistente, cu două dungulițe albicioase pe dos. Ornamental prin frunzișul său și prin conurile sale erecte, care se dezmembrează la maturitate. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Abies concolor* (Gordon) Lindl. ex Hildebr.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Abies concolor</i> (Gordon) Lindl. ex Hildebr.	Brad argintiu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din vestul Americii de Nord. Prezintă frunze aciculare, persistente, lungi de 4-6 cm, argintii-albăstrui sau verzi-argintii, neînțepătoare. Ornamental prin portul și frunzișul său. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Acer campestre* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer campestre</i> L.	Jugastru	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, spontan în zona de câmpie și deal. Lujeri uneori suberoși, aripați, cu muguri opuși; frunze 3-5 lobate, căzătoare toamna, flori gălbui, modeste, grupate în inflorescențe de tip corimb; fructele sunt disamare dispuse sub un unghi de 180°. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Acer negundo* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer negundo</i> L.	Arțar american	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mijlocie, cu trunchiurile nu întotdeauna drepte, originar din estul și centrul Americii de Nord. Lujeri glabri, adesea brumați, frunze imparipenat compuse cu 3-5 foliole, căzătoare toamna, fructele sunt disamare cu aripile în unghi ascuțit. Ornamental mai ales prin frunzișul său, prezentând câteva varietăți de cultură decorative. După dud este a doua preferată de omida păroasă a dudului (<i>Hyphantria cunea</i>) ca îi roade frunzele. Sălbăticit în lunca Crișului Alb, cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Acer palmatum* Thunb. 'Atropurpureum'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer palmatum</i> Thunb. 'Atropurpureum'	Arțar japonez cu frunza roșie	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, originar din Japonia și Coreea, cu frunzele palmate, adânc lobate de culoare roșu-închis. Flori mici, purpurii, dispuse în corimbe mici; aripile samarelor sunt dispuse în unghi obtuz. Ornamental atât prin portul său etajat, cât mai ales prin frunzișul roșiatic în tot sezonul de vegetație. Cultivat foarte rar în Nădab.		

***Acer platanoides* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer platanoides</i> L.	Arțar, Paltin de câmp	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mare, spontan la noi în țară, prin păduri, mai ales în zona de câmpie și deal. Trunchiul drept, coroana deasă, frunzele 5-lobate, cu lobi ascuțiți și înrândurile dintre lobi rotunjite. Înfloarește înainte de înfrunzire, florile sunt modeste, grupate în corimbe erecte. Fructele sunt disamare, pendente, iar unghiul dintre aripi este de 130°. Ornamental prin portul său, apreciat și pentru umbra pe care o face, iar toamna se remarcă prin frunzișul său galben auriu, înainte de cădere. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Acer platanoides* L. 'Columnare'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer platanoides</i> L. 'Columnare'	Paltin de câmp columnar	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, cu coroană îngust columnară, foarte decorativ, utilizat mai ales acolo unde sunt spații înguste. Se înmulțește prin altoire pe portaltoi de paltin de câmp. Cultivat sporadic în centrul orașului Chișineu-Criș.	

***Acer platanoides* L. 'Crimson King'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer platanoides</i> L. 'Crimson King'	Paltin de câmp cu frunza roșie	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, cu frunzele purpurii-închis, foarte decorativ. Se înmulțește prin altoire pe portaltoi de paltin de câmp. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Acer platanoides* L. 'Globosum'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum'	Paltin de câmp globulos	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, cu coroană compactă, globuloasă, foarte des ramificată, care nu necesită tundere. Se înmulțește prin altoire pe portaltoi de paltin de câmp, altoirea realizându-se la înălțimea de la care se dorește să pornească coroana. Ornamental prin coroana sa rotundă, indicat în aliniamentele stradale sub liniile electrice deoarece rămâne de talie relativ mică. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Acer pseudoplatanus L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Paltin de munte, Paltin	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan la noi în țară, prin păduri, mai rar la câmpie și frecvent la deal și munte. Trunchiul drept, coroana deasă, frunzele 5-lobate, cu lobii ascuțiți și întrândurile dintre lobi tot ascuțite. Înfloarește după înfrunzire prin luna mai, florile verzi-gălbui, grupate în raceme pendente. Fructele sunt disamare cu nucula bombată, pendente, iar unghiul dintre aripi este drept. Ornamental prin portul său și apreciat pentru umbra pe care o face. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	


Acer saccharinum L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer saccharinum</i> L.	Arțar argintiu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, repede crescător, originar din America de Nord. Coroana largă, mugurii roșietici, frunzele 5-lobate, verzi pe fața superioară, alb-argintii pe dos, toamna colorate în galben. florile sale apar primăvara devreme, iar samarele se coc în luna mai. Seva brută a acestui arțar conține anumite zaharuri. Ornamental mai ales prin frunzișul său. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Aesculus hippocastanum L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Hippocastanaceae</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Castan porcesc, Castan sălbatic	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din Peninsula Balcanică. Trunchiuri drepte, coroană globuloasă, lujeri viguroși cu mugurii terminali mari și cleioși. Frunze palmat-compuse cu 5-7 foliole sesile. Florile albe cu pete galbene și roșietice, grupate în panicule terminale, erecte, de 20-30 cm lungime. Fructul este globulos cu numeroși ghimpi scurți, se desface în 3 valve și eliberează de regulă o sămânță (castană), mai rar două trei. Ornamental prin portul său, dar mai ales prin florile sale. A fost frecvent cultivat în aliniamentele stradale și ca arbore izolat. Din păcate, în ultimele două decenii, frunzele castanului porcesc sunt atacate de larvele unui microlepidopter (<i>Cameraria ohridella</i>), se pătează și cad înainte de vreme. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Cenușer	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, originar din China, naturalizat la noi în țară. Repede crescător, lujerii groșii, frunze lungi (40-90 cm), imparipenat-compuse cu numeroase foliole. Flori galben-verzui hermafrodite sau masculine, mici, grupate în panicule terminale laxe, cele masculine neplăcut mirositoare; fructele sunt samare aripate de 3-4 cm lungime și 1 cm lățime, galbene deschise sau brun-roșcate. Ornamental prin frunzișul și fructele sale. Sporadic pe marginea canalelor, în lunca Crișului Alb, dar și cultivat în Chișineu-Criș și Nădab.	

Albizia julibrissin Durazz.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Fabaceae	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Albiție, Arbore de mătase	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, originar din Asia subtropicală, din Iran până în Japonia. Trunchiuri scurte, coroana etalată, puțin ramificată, cu ramuri divergente (ceea ce poate duce, în timp, la despicierea tulpinii în două, sau desprinderea de trunchi a unei ramuri principale). Frunzișul elegant, foarte fin (dublu penat compus cu foliole mici). Valoarea ornamentală a speciei este dată de înflorirea de lungă durată (iunie-august) când apar inflorescențele, asemenea unor buchete dese de filamente mătăsoase, roz pal (ale staminelor). Fructele sunt păstăi, care pot persista în coroană până spre iarnă. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Amorpha fruticosa L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Fabaceae	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Amorfă, Salcâm pitic	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-3 m înălțime, originar din America de Nord, sălbăticat la noi, uneori invaziv în luncile râurilor. Port arbustiv, cu numeroase tulpini de la bază, foarte elastice. Frunze imparipenat compuse, asemănătoare cu ale salcâmului, dar mai mici. Înflorire în mai-iunie, formând spice terminale, erecte, cu flori mici violet-brunii-albăstrui. Fructul este o păstaie, sub 1 cm, cu 1-2 semințe. Deși este ornamentală prin aspectul și florile sale, deși tulpinile sunt frecvent folosite, cultura acestei specii nu este indicată datorită caracterului său invaziv, și respectiv combatere sale dificile. Frecvent în lunca Crișului Alb, cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Berberis thunbergii* DC.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Dracilă japoneză	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2,5 m înălțime, puternic ramificat, originar din Japonia. Lujerii prezintă spini simpli, rar 3-furcați, frunze căzătoare, foarte variate, îngustate la bază. Flori galbene cu nuanțe roșiatice la exterior, de până la 1 cm, solitare sau câte 2-4 în fascicule. Fruct elipsoidal de 7-10 mmlungime, roșu-srălucitor, persistent peste iarnă. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Berberis vernae* C.K.Schneid.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis vernae</i> C.K.Schneid.	Dracilă	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 1,5 m înălțime, originar din nordul Chinei. Lujeri cu spini simpli, frunze căzătoare, inegale, verzi, toamna se colorează în roșu. Florile galbene, în raceme pendente, fruct globulos de circa 5 mm, roșu-pal. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Betula pendula* Roth**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Betulaceae</i>	<i>Betula pendula</i> Roth	Mesteacăn	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, spontan în zona de deal și munte. Este deosebit de decorativ prin coroana aerată, cu ramuri subțiri și lujeri pendenți și prin scoarța albă, care se exfoliază în fâșii circulare. La bătrânețe formează, la baza tulpinii, un ritidom negricios, adânc crăpat. Frunze romboidal-triunghiulare, toamna devin galbene aurii. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Buxus sempervirens* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Buxaceae</i>	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Cimișir, Buxus	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, frecvent folosit în spațiile verzi, atât ca exemplare izolate, cât mai ales sub formă de garduri vii, originar sudul Europei, nordul Africii și vestul Asiei. Dens ramificat, cu lujeri tineri verzi, 4-muchiați, cu frunze eliptice sau ovate, de 1-3 cm lungime, persistente, lucioase pe ambele fețe. Flori modeste, grupate în buchete axilare. Fructul este o capsulă de până la 1 cm lungime, cu semințe negricioase, lucitoare. Se înmulțește foarte ușor prin butășire. Ornamental prin portul și frunzișul său, se pretează foarte bine la tundere. Din păcate în ultimii 2 ani, la noi în țară, această plantă este atacată de omida fluturului <i>Cydalima perspectalis</i>, atac care poate duce la uscarea plantei. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Campsis radicans* (L.) Seem.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Bignoniaceae</i>	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Trâmbiță, Luleaua turcului	Liană
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Liană lemnoasă urcătoare, cu multe rădăcini aeriene cu care se fixează de suport, originară din America de Nord. Frunze cu 9-13 foliole. Flori portocalii la exterior, asemănătoare cu niște trompete, lungi de 6-9 cm, grupate în raceme terminale. Fructul este capsulă de 8-12 cm lungime, cu două valve, semințele turtite aripate. Se înmulțește ușor prin butășire și marcotaj. Ornamental mai ales prin florile sale. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Castanea sativa* Mill.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castan comestibil	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan la noi în țară. Frunze alungit-lanceolate, de 10-22 cm lungime și 4-8 cm lățime, cu margini dințate. Florile masculine în amentzi, cele femele solitare sau grupate câte 3. Fructele comestibile, sunt achene mari, brune, închise într-o cupă aproape sferică spinoasă, care se deschide la maturitate în 2-4 valve. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Catalpa bignonioides* Walter**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Bignoniaceae</i>	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Catalpă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, originar din estul Americii de Nord. Lujeri viguroși, frunze simple, mari de 10-20 cm lungime și 10-15 cm lățime, cordate la bază, ascuțite la vârf, căzătoare toamna. Flori mari de 4-5 cm lungime, albe cu pete galbene, grupate în panicule lat-piramidale de 15-25 cm lungime. Fructul este de 20-40 cm lungime, cilindric, se deschide prin 2 valve, iar semințele sunt turtite și aripate. Ornamental prin frunzele, florile și fructele sale și apreciat pentru umbra sa. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Catalpa bignonioides* Walter 'Nana'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Bignoniaceae</i>	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter 'Nana'	Catalpă globuloasă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, cu coroană compactă, globuloasă ușor aplatizată, foarte des ramificată, care nu necesită tundere. Se înmulțește prin altoire pe portaltoi de catalpă, altoirea realizându-se la înălțimea de la care se dorește să pornească coroana. Ornamental prin coroana sa rotundă, indicat în aliniamentele stradale sub liniile electrice deoarece rămâne de talie relativ mică. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Celtis occidentalis* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Ulmaceae</i>	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Sâmbovină americană	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, originar din America de Nord. Trunchiuri torsionate, cu scoarța prevăzută cu numeroase excrescențe suberoase, dure. Frunze simple, serate pe margine, asimetrice la bază, aspre la pipăit, căzătoare toamna. Florile modeste, fructul sferic de 7-10 mm, portocaliu la purpuriu închis, comestibil și apreciat mult și de păsări. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach**

Subîncrengătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	Gutui japonez	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2 m înălțime, originar din Japonia. Prezintă mai multe tulpini de la bază, lujerii spinoși, frunze de 3-5 cm lungime, flori roșii-cărmizii, solitare sau câte 2-4, care ănfloresc primăvara devreme, înaintea înfrunzirii depline. Fructe globuloase de 4-5 cm, galbene, parfumate. Ornamental mai ales prin florile sale, dar și prin fructe. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl.**

Subîncrengătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl.	Chiparos de California	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mijlocie, originar în America de Nord. Coroana îngust-piramidală, cu vârful aplecat, nutant. Lujerii ramificați într-un singur plan, bogat înfrunziți, cu frunze solzoase, mici, verzi închis, persistente. Conurile sferice, de până la 1 cm. Ornamental prin portul și cetina sa. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Alumii'**

Subîncrengătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Alumii'	Chiparos de California albastrui	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică sau ramâne arbust, cu siluetă compactă, îngust conică, cu colorit albastrui. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Columnaris Glauca'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Columnaris Glauca'	Chiparos de California columnar	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică, cu siluetă compactă, cu port erect, columnar, lăstari scurși erecti, frunziș albastrui-brumat. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii'	Chiparos de California compact	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 4-5 m înălțime, de formă conică, compactă, cu lăstari erecti, frunziș dens, verde-glauc. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii Gold'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii Gold'	Chiparos de California compact auriu	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 4-5 m înălțime, de formă conică, compactă, cu lăstari erecti, frunziș dens, verde-gălbui. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Globosa'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Globosa'	Chiparos de California globulos	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 2-3 m înălțime, cu coroana globuloasă, cu vârful lujerilor aplecat. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Lutea'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl. 'Lutea'	Chiparos de California auriu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mijlocie-mică, cu portul columnar, cu vârful aplecat, cu lujerii ușor spiralați și cu frunzisul verde-gălbui-auriu. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	Chiparos de Sawara	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din Japonia. Coroană conică, lujeri anuali comprimați, frunze persistente, nealipite pe ramuri. Conuri de 0,6-0,8 cm diametru. Cultivat foarte rar în Nădab.	

***Clerodendrum trichotomum* Thunb.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Lamiaceae</i>	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	Clerodendron, Floarea norocului	Arbust /arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, mai rar arbore de până la 8 m înălțime, originar din estul Chinei, Japonia. Frunze opuse, mari de până la 10-20 cm lungime și 7-9 cm lățime. Flori albe, parfumate, grupate în inflorescențe terminale laxe de 12-24 cm diametru. Fructe albastre, de 6-8 mm diametru, însoțite de caliciu etalat, stacojiu. Specie sensibilă la ger. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Cornus alba* L. 'Sibirica'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus alba</i> L. 'Sibirica'	Sânger siberian	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, nestolonifer, originar din Siberia, Manciuria, Coreea de Nord. Creștere mai slabă decât la specia tipică; lujeri cu scoarța roșu-corai lucioasă. Fruct alb-murdar până la albastru deschis. Ornamental mai ales iarna când lujerii săi sunt bine puși în evidență. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Cornus mas* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus mas</i> L.	Corn	Arbust /arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore de până la 7-8 m înălțime, spontan la noi, în zona de câmpie și deal, mai rar la munte. Frunze ovat-acuminate, flori galbene, axilare, apar primăvara devreme înainte de înfrunzire. Fructele elipsoidale roșii, lucitoare, acrișoare, se numesc coarne. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Cornus sanguinea* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sânger	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, de până la 4 m înălțime, spontan la noi în țară. Lujerii verzi-brunii, roșcați spre partea însovită. Frunze lat-eliptice, se colorează toamna în roșu sângerieu. Flori albe, mici, în inflorescențe, apar în mai. Fructe negre, sferice. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri, cultivat sporadic mai ales sub formă de garduri vii în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Corylus avellana* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Corylaceae</i>	<i>Corylus avellana</i> L.	Alun comun, Alun	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, spontan, de până la 5 m înălțime. Crește sub formă de tufă, cu mai multe tulpini de la bază, frunzele mari, cordate, florile modeste, fructele numite alune sunt comestibile, stau câte 1-4, cu involucru foliaceu campanulat, mai scurt sau cel mult egal cu aluna. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Corylus colurna* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Corylaceae</i>	<i>Corylus colurna</i> L.	Alun turcesc	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mijlocie, spontan în Banat și Oltenia. Tulpina dreaptă, coroană piramidală, lujerii tineri glandulos-păroși. Alunele grupate câte 3-10 în buchete globuloase, ascunse într-un involucru adânc și neregulat laciniat, glandulos. Alunele puțin mai mici, comestibile. Cultivat rar în Chișineu-Criș.		

Corylus maxima Mill.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Corylaceae</i>	<i>Corylus maxima</i> Mill.	Alun	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, rar arbore de până la 10 m înălțime, originar din sud-estul Europei și vestul Asiei. Frunze mari, cordate la bază, dublu serate, de obicei lobulate, florile modeste, fructele comestibile, stau câte 1-3, cu involucru foliaceu tubulos, de 2 ori mai lung decât aluna, îngustat deasupra acesteia, adânc laciniat. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș.	

Cotinus coggygria Scop. 'Royal Purple'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Cotinus coggygria</i> Scop. 'Royal Purple'	Scumpie cu frunze roșii	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 5 m înălțime, specie tipică spontană la noi în sudul și estul țării. Frunze eliptice până la obovate, lung pețiolate, de culoare purpuriu închis. Flori neînsemnate. Fructe plumoase, culoare purpuriu închis. Cultivat foarte rar în Nădab.	

Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. 'Skogholm'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid. 'Skogholm'	Cotoneaster târător	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, târător, originar din China. Frunze mici, eliptice, de 1-2 cm lungime, persistente. Flori albe, mici, apar în mai-iunie. Fructe roșii, globuloase. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Crataegus laevigata* (Poir.) DC.**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Păducel	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, uneori cu port arborescent, de până la 5 m înălțime, spontan în vestul și sud-vestul României. Ramuri divergente, lujeri glabri, cu spini puternici, frunze 3-5 lobate. Flori albe cu antere roz, sau roze, grupate în inflorescențe terminale. Fruct subglobulos, stacojiu, de 8-15 mm, cu 2-3 sâmburi. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Crataegus monogyna* (L.) Jacq.**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus monogyna</i> (L.) Jacq.	Păducel	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, sau arbore de până la 10 m înălțime, cu ramuri ascendente, spontan la noi în țară. Prezintă spini de circa 1 cm, frunze 3-5 lobate, flori albe sau roz, de circa 2 cm diametru, în corimbe multiflore. Fruct globulos, subglobulos, de până la 1 cm, cu un sâmbure. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Cupressus arizonica* Greene**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	Chiparos de Arizona	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore răsinos, de talie mică-mijlocie, uneori rămâne arbustiv, originar din America de Nord (Arizona, New Mexico, nordul Mexicului). Coroana conică, frunzișul solzos persistent, verde-albăstrui brumat. Conurile sferice de 1-2,5 cm. Se pretează bine la tundere. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Cupressus × leylandii* A.B.Jacks. & Dallim.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Cupressus × leylandii</i> A.B.Jacks. & Dallim.	Chiparos hibrid	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică-mijlocie, repede crescător, de origine hibridă. Coroana dens columnară, cu ramuri viguroase, frunzis solzos, de culoare verde, persistent. Se pretează bine pentru garduri vii dar și pentru perdele mai înalte, însă este deosebit și ca arbore izolat. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Cupressus macrocarpa* Hartv. 'Goldcrest'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartv. 'Goldcrest'	Chiparos	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mijlocie, dar poate fi menținut și cu port arbustiv, originar din California. Coroană columnară, densă, cu habitus compact. Frunze solzoase, de culoare verzi-gălbui, iar cele de pe vârful lujerilor tineri sunt mai galbene. Se pretează foarte bine la tundere. Este sensibil la ger. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Cydonia oblonga* Mill.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Gutui	Arbust / arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore, de 1-8 m înălțime, originar din Transcaucazia, Persia, Turkestan și Arabia. Ramuri nespinoase. Lujerii tineri, dosul și pețiolul frunzelor, fructele sunt tomentoase (păroase). Frunze rotund-ovate, de 5-10 cm lungime, căzătoare toamna; flori solitare, albe sau roze, de 4-5 cm în diametru, foarte decorative. Fructul este poamă, galben, tomentos, parfumat, comestibil. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Deutzia scabra* Thunb.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Hydrangeaceae</i>	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Deuție	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2 m înălțime, originar din China și Japonia. Lujeri fistuloși, bruni-roșcași, frunze ovate sau ovat-lanceolate, cele mature scabre, aspre la pipăit. Flori albe sau roz, stelate, în inflorescențe erecte, lungi de 6-12 cm, apar în iunie. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Elaeagnus angustifolia* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Elaeagnaceae</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Sălcioară	Arbust /arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore, de mici dimensiuni, până la 7-8 m înălțime, originar din Asia temperată, devenit subspontan în sudul Europei. Tulpină neregulată, lujeri tineri albicios-mat-tomentoși, prezintă spini. Frunze alungit-laciniate, verzi-cenușii pe față, argintii-lucitoare pe dos. Flori mici, galbene, foarte parfumate, apar în mai-iunie. Fructe elipsoidale, argintii. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Moșmon japonez	Arbust / arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore de talie mică, originar din China, Japonia. Prezintă frunzis persistent, însă la noi, din cauza gerului, adeseori acestea cad. Frunze alterne, lungi de 10-25 cm, flori albicioase, grupate în inflorescențe terminale. Fruct globular sau piriform, galben, de 4-5 cm, comestibil. Sensibil la ger și din acest motiv este foarte rar cultivat la noi. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Euonymus europaeus L.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Salbă moale	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, de până la 6 m înălțime, spontan la noi, fiind frecvent prin pădurile de câmpie și deal. Lujeri verzi, tetramuchiați; frunze ovate, căzătoare toamna; flori verzi-gălbui; fructele sunt capsule de 1-1,5 cm, la maturitate de culoare roșu-carmin sau roz, cu 1-2 semințe albicioase, învelite complet de un aril portocaliu. Ornamentală mai ales prin fructele sale. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.		

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Celastraceae	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Salbă târâtoare	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, cățăraător sau târâtor, originar din China și Japonia. Lujeri verzi, frunze persistente, de 3-6 cm lungime, foarte variabile, flori neînsemnate, fructifică doar unele soiuri. Se înmulțește ușor prin butășire, marcotaj și despărțirea tufei. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.		

Euonymus japonicus Thunb.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Celastraceae	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Salbă japoneză	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, de 2-3 m înălțime, originar din Japonia și Coreea. Creștere erectă, ramuri întunecat-verzi, frunze persistente, piezoase, lucioase, de 3-7 cm lungime și 2-4 cm lățime, de culoare verde închis. Flori neînsemnate, fructe roz, nelobate, de până la 1 cm, semințe albe, cu aril portocaliu. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Euonymus japonicus* Thunb. 'Aureovariegatus'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Celastraceae</i>	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. 'Aureovariegatus'	Salbă japoneză variegată	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-3 m înălțime, originar din Japonia și Coreea. Creștere erectă, ramuri verzi-gălbui, frunze persistente, pielose, lucioase, de 3-7 cm lungime și 2-4 cm lățime, verzi marmorate cu galben-auriu. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Ficus carica* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Moraceae</i>	<i>Ficus carica</i> L.	Smochin	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore, de până la 10 m înălțime, originar din Regiunea mediteraneană și sud-vestul Asiei, la noi subspontan Dobrogea și sudul Banatului. Adesea cu mai multe tulpini de la bază, lujeri groși, frunze mari, palmat lobate. Fructul cărnos, piriform, comestibil, foarte dulce. Specie sensibilă la ger. Se înmulțește ușor prin butași. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Forsythia × intermedia* Zabel**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Forsythia × intermedia</i> Zabel	Forsiția hibridă	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, de origine hibridă. Frunze ovate-oblongi, până la oblong-lanceolate, uneori 3-partite pe lăstarii viguroși. Flori galbene, mari, numeroase, apar la început de martie. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Forsiția, Clopoșel galben, Ploaie de aur	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, cu tulpini erecte și ramuri divergente sau pendente, originar din China. Ramuri ușor 4-muchiatare, frunze ovate până la oblong-ovate, serate pe marginede 6-10 cm lungime. Flori grupate câte 1-3, galbene-aurii. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Fraxinus americana* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus americana</i> L.	Frasin american	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din estul și centrul S.U.A. Lujeri tineri glabri, muguri, opuși, întunecat bruni. Frunze imparipenat compuse, cu 5-9 foliole, foarte variabile. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Fraxinus excelsior* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frasin	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, coroană ovoidală. Lujeri cenușiu-verzi, glabri, cu muguri negri. Frunze imparipenat compuse, toamna galbene. Fructe sunt samare pendule, de 2,5-4 cm lungime, cu aripa decurentă spre bază. Spontan și cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Fraxinus excelsior* L. 'Aurea'**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus excelsior</i> L. 'Aurea'	Frasin auriu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, cu creștere slabă. Muguri foarte înghesuiți. Scoarță galbenă, niciodată cu dungi. Frunze imparipenat compuse, la început verzi-gălbui, mai târziu galbene. Cultivat rar în centrul orașului Chișineu-Criș.	


***Fraxinus ornus* L. 'Meczek'**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus ornus</i> L. 'Meczek'	Mojdrean globulos	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică. Coroană sferică, compactă, lujeri scurți viguroși. Se înmulțește prin altoire. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Ginkgo biloba* L.**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Ginkgoaceae</i>	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginco, Arborele pagodelor	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din China Orientală. Specie dioică, arborii masculi au coroană piramidală iar arborii femeli coroană etalată. Frunze bilobate, în formă de evantai, solitare pe lujerii lungi și în fascicule (3-5) pe lujerii scurți, toamna galbene-aurii. Semințele, false drupe (galbulus) de 2-3 cm lungime, galbene la maturitate. Are importanță ornamentală și medicinală. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Gleditsia triacanthos* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Glădiță, Plătică	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din America de Nord. Lujerii, adesea și trunchiul, prevăzuți cu spini simpli sau ramificați, de 5-10 cm lungime. Frunze lungi de 14-30 cm, simplu penat-compuse sau dublu penat-compuse, cu foliole de 0,8-3 cm. Flori poligame, în raceme axilare, verzi, plăcut mirositoare, melifere. Fructele sunt păstăi, lungi de 30 -40 cm și late de 4-5 cm, brun-roșcate. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Gymnocladus dioica* (L.) K.Koch**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K.Koch	Roșcov de Canada	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din America de Nord. Trunchi drept, viguros, cu ritidom solzos. Lujeri foarte groși, frunze foarte lungi, de până la 1 m, dublu paripenate, cu foliole de 5-7 cm lungime și 3 cm lățime. Florile dioice modeste, fructele sunt păstăi de 13-20 cm lungime și 4-5 cm lățime. Cultivat foarte rar în Nădab.	

***Hamamelis virginiana* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Hamamelidaceae</i>	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Hamamelis	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 5 m înălțime, adesea cu port arborescent, originar din estul Americii de Nord. Frunze alterne, simple, ovate, obovate sau eliptice, asimetrice la bază, scurt pețiolate. Flori galbene-deschise, cu patru petale înguste, înfloresc toamna-iarnă. Fructul este o capsulă bivalvă de până la 2 cm, cu 2 semințe negre lucitoare. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	


***Hedera helix* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Araliaceae</i>	<i>Hedera helix</i> L.	Iederă	Liană
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu		Descriere	
			Liană lemnoasă viguroasă, agățătoare, prezintă rădăcini adventive cu ajutorul cărora se susține, iar dacă nu are suport rămâne târătoare pe sol. Este spontană la noi. Frunze persistente, verzi, lobate și mate (pe lăstari sterili), și romboidale și lucitoare (pe lăstari fertili). Flori galbene-verzui, mici, în inflorescențe globuloase, apar în septembrie. Fructele sunt bace negre-albăstrui, globuloase, de circa 6 mm diametru, se coc primăvara. Spontană și cultivată sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Hibiscus syriacus* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Malvaceae</i>	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Zămoșită	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu		Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, rar poate ajunge la 5-6 m, originar din Asia Mică, China și India. Frunze ovate sau rombico-ovate, de obicei trilobate și neregulat dințate, de 5-10 cm lungime, căzătoare toamna. Flori mari de 6-10 cm diametru, divers colorate, cel mai adesea albăstrui, purpurii sau albe, uneori inoalte (duble); perioadă lungă de înflorire. Fructul este capsulă. Are o mare valoare ornamentală, fiind cultivat atât izolat cât și sub formă de garduri vii, deoarece se pretează foarte bine la tundere. Cultivat foarte frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Juglans cinerea* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Juglandaceae</i>	<i>Juglans cinerea</i> L.	Nuc cenușiu	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu		Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie-mare, originar din America de Nord. Trunchiul drept, lujerii pubescenti, viguroși, frunzele imparipenat compuse, cu 11-19 foliole oblong-lanceolate, serate pe margini, păroase pe ambele fețe. Fructele grupate câte 2-5, ovoid-alungite, de 4-6,5 cm lungime. Nuca alungită, în 4 muchii, are vârful ascuțit. Cultivat foarte rar în Nădab.	

Juglans regia L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nuc	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie-mare, subspontan și frecvent cultivat la noi, originar din Asia Mică, Caucaz, Asia. Tulpina de regulă scurtă, scoarța mult timp netedă, lujerii viguroși, glabri, lucitori; frunze imparipenat compuse cu 5-9 foliole asimetrice, foliola terminală întotdeauna mai mare. Florile masculine în amenți, cele femele, câte 1-4 adesea terminale. Fructele sferice sau elipsoidale, cu un înveliș exterior cărnos, verde, care se crapă la maturitate, eliberând nuca, care are miezul comestibil. Lemnul de nuc este foarte apreciat în industria mobilei. Cultivat foarte frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Juniperus chinensis L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus chinensis</i> L.	Ienupăr chinezesc	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, originar din China, unde crește ca și arbore; în Europa rămâne de talie arbustivă. Coroană larg-conică sau semitârătoare, cu lujeri subțiri și frunze atât solzoase mici, cât și aciculare de până la 12 mm lungime, înțepătoare. Flori dioice, exemplarele femele formând pseudobaceglobuloase de 6-8 mm, brune-violacee, la maturitate. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Juniperus communis L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	Ienupăr comun	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 5 m înălțime, cu mai multe tulpini de la bază, spontan la noi, în zona de deal și munte. Lujerii anuali în 3 muchii, frunze aciculare, persistente, câte 3 în verticil, lungi de 1-1,5 cm, puternic înțepătoare. Flori dioice, rar monoice, pseudobacele sunt sferice, de 6-9 mm diametru, înainte de coacere verzi, la maturitate (anul 2 sau 3) negre-albăstrui, brumate. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Juniperus communis L. 'Hibernica'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. 'Hibernica'	Ienupăr comun columnar	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 5 m înălțime, cu portul compact columnar. Frunzișul dens, acicular, înțepător. Cultivat foarte rar în Nădab.	

Juniperus horizontalis Moench

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	Ienupăr orizontal	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, târător de până la 1, 5 m înălțime și 3-4 m lățime, originar din America de Nord. Prezintă, ramificații orizontale lungi, lăstari scurți, deși. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Juniperus × media Van Melle. 'Pfitzeriana Aurea'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus × media</i> Van Melle. 'Pfitzeriana Aurea'	Ienupăr auriu	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de talie mică, prostrat, de origine hibridă. Frunzișul persistent, este predominant solzos; creșterile tinere sunt galbene-aurii, devenind mai verzui în timpul iernii. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Juniperus × media* Van Melle. 'Pfitzeriana Glauca'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Juniperus × media</i> Van Melle. 'Pfitzeriana Glauca'	Ienupăr	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de talie mică, larg etalat, de origine hibridă. Frunzișul persistent, de culoare verde-albăstrui intens, este predominant solzos. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Juniperus sabina* L. 'Tamariscifolia'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Juniperus sabina</i> L. 'Tamariscifolia'	Cetină de negi	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, semitârâtor, de talie mică, spontan la noi, în zona montană. Portul etalat, cu ramuri orizontale și lăstari erecți. Frunze aciculare mici și solzoase. Pseudobace sferice, de 5-7 mm, negre-albăstrui brumate, necomestibile. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Juniperus scopulorum* Sarg.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg.	Ienupăr argintiu	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos; în America de Nord, de unde este originar, ajunge arbore de talie mică. Adesea prezintă mai multe tulpini de la bază. Coroană piramidală, lujeri erecți, frunziș solziform, alipit de lujeri, albăstrui-brumat. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Juniperus scopulorum Sarg. 'Skyrocket'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. 'Skyrocket'	Ienupăr rachetă	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, mai rar arbore de până la 6 m înălțime. Port îngust-fastigiat, cu lăstari fini, erecți și frunziș solziform, albastrui-cenușiu. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don 'Blue Carpet'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex D.Don 'Blue Carpet'	Ienupăr târător	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, târător de până la 0,5 m înălțime și 1,5 m lățime, originar din China. Frunze persistente, aciculare, verzi albastrui. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Juniperus virginiana L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Ienupăr de Virginia	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos de talia mijlocie, cu coroană piramidală, originar din estul și sud-estul Americii de Nord. Tulpină dreaptă, adesea canelată la bază, cu ritidom crăpat în plăci alungite. Lujeri foarte subțiri, frunze mici, solzoase sau aciculare, persistente. Flori dioice, rar monoice; pseudobace ovoide, de circa 6 mm, albastrui-brumate, cu 1-2 semințe. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Juniperus virginiana L. 'Spartan'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Juniperus virginiana</i> L. 'Spartan'	Ienupăr de Virginia compact	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 5 m înălțime, cu portul erect, coroană neregulată, compactă. Frunzisul solzos sau acicular, persistent, de culoare verde-închis. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Kerria japonica (L.) DC.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Keria	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2-3 m înălțime, originar din China și Japonia. Prezintă mai multe tulpini de la bază, lujerii verzi; frunze alterne, alungit-ovate, dublu serate pe margine. Flori galbene, apar în aprilie-iunie, dar perioada de înflorire se poate prelungi până spre toamnă. Ornamental mai ales prin florile sale. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Koelreuteria paniculata Laxm.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Sapindaceae	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Koelreuteria, Clocoțiș chinezesc	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, originar din China, Coreea și Japonia. Frunze penat-compuse sau uneori bipenate, până la 45 cm lungime și 25 cm lățime, cu 7-15 foliole. Flori galbene de circa 1 cm, dispuse în inflorescențe (panicule) mari de 25-40 cm lungime și 25 cm diametru la bază. Fructul este o capsulă de până la 5 cm lungime, cu 3 semințe globuloase, negre de circa 1 cm diametru. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Kolkwitzia amabilis Graebn.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Caprifoliaceae	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Kolkwitia	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, originar din centrul Chinei. Prezintă mai multe tulpini de la bază, lujeri viguroși, erecti, frunze căzătoare, lat-ovate, de 3-8 cm lungime și 1,5-2 cm lățime. Flori roz la exterior, gălbui la interior, dispuse în perechi, în inflorescențe terminale de 5-7 cm diametru. Fruct uscat țepos. Se înmulțește ușor prin butășire. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Laburnum anagyroides Medik.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Fabaceae	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Salcâm galben	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore de până la 7 m înălțime, spontan mai ales în jumătatea sudică a țării. Lujeri verzi, la început alipit păroși, ulterior glabri. Frunze trifoliolate; flori galbene, neparfumate, în inflorescențe pendule, apar în aprilie-mai. Fruct păstaie dehiscentă, de 5-7 cm, cu 3-7 semințe. Plantă toxică. Valoare ornamentală mare pentru florile sale. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Larix decidua Mill.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Pinaceae	<i>Larix decidua</i> Mill.	Larice, Zadă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, coroană larg-piramidală, spontan la noi în zona montană. Trunchi drept, lujeri subțiri, pendenți. Frunze aciculare căzătoare, lungi de 1-3 cm, moi, dispuse solitar pe lujerii lungi și în smocuri bogate (câte 30-40) pe lujerii scurți. Conuri mici (2-3 cm), erecte. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Ligustrum ovalifolium* Hassk.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Lemn câinesc japonez	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, erect, de până la 5 m înălțime, originar din Japonia. Frunzele căzătoare până la semisempervirente, eliptic-alungite, de 3-7 cm lungime, verzi lucitoare pe fața superioară. Flori alb-gălbui, în inflorescențe terminale erecte de 5-10 cm lungime, fructe bace negre, de 5-7 cm diametru. Se pretează foarte bine la tundere și se înmulțește ușor prin butășire. Cultivat frecvent, mai ales sub formă de garduri vii, în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Ligustrum ovalifolium* Hassk. 'Aureum'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. 'Aureum'	Lemn câinesc japonez cu frunze aurii	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, erect, de până la 3 m înălțime, originar din Japonia. Frunzele căzătoare până la semisempervirente, eliptic-alungite, de 3-7 cm lungime, lat-bordate cu galben-auriu sau complet galbene. Flori alb-gălbui, în inflorescențe terminale erecte de 5-10 cm lungime, fructe bace negre, de 5-7 cm diametru. Se pretează foarte bine la tundere și se înmulțește ușor prin butășire. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Ligustrum vulgare* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Lemn câinesc	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 5 m înălțime, spontan prin păduri. Frunze alungit-ovate la lanceolate, căzătoare, mai rar rămân verzi și iarna, mai ales la baza lujerilor. Flori albe, în panicule terminale erecte, piramidale, de 6-8 cm lungime, fructe bace negre, de 6-8 cm diametru, cu 1-4 semințe. Se pretează foarte bine la tundere și se înmulțește ușor prin butășire. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat frecvent, mai ales sub formă de garduri vii, în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Liquidambar styraciflua* L.**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Altingiaceae</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Arborele de Ambră	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din America de Nord. Trunchi drept, coroană piramidală, lujerii suberos-aripați, frunze palmat-lobate foarte decorative, mai ales toamna când se colorează în diferite nuațe vii de roșu. Flori modeste, fructe globuloase de 2-3 cm. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	


***Liriodendron tulipifera* L.**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Magnoliaceae</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Arbore lealea	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios de talie mare, coroană ovoidală. Frunze mari de 7-12 cm lungime, în formă de liră, cu patru lobi, toamna se colorează în galben. Flori mari solitare, galben-verzui, campanulate, cu aspect de lealea, apar în mai-iunie. Fructul este în formă de con, cu numeroase samare aripate. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Lonicera fragrantissima* Lindl. & J.Paxton**

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. & J.Paxton	Caprifoi mirositor	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, semisempervirescent, de până la 4 m înălțime, originar din estul Chinei. Prezintă mai multe tulpini de la bază, lujerii viguroși, glabri, frunze eliptice la lat-ovate, de 3-7 cm lungime și 2-4,5 cm lățime, semipersistente. Flori albe, foarte parfumate, apar în martie-aprilie, iar fructele sunt bace roșii-sângerii. Se pretează bine la tundere și se înmulțește ușor prin butășire. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Lonicera japonica* Thunb.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Mâna Maicii Domnului, Caprifoi japonez	Liană
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Liană lemnoasă volubilă, viguroasă, originară din estul Asiei, Japonia. Frunze ovate până la oblong-ovate, semipersistente. Flori albe, care după polenizare se colorează în galben, parfumate, apar în mai-septembrie. Fructele sunt bace negre. Cultivată sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Lonicera ligustrina* Wall. var. *yunnanensis* Franch.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera ligustrina</i> Wall. var. <i>yunnanensis</i> Franch.	Loniceră	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, sempervirent, de până la 1(-2) m înălțime, originar din vestul Chinei. Portul semitârător, lujerii anuali rotunzi, frunze persistente, îngust ovate, de 6-12 mm lungime. Flori de 1 cm, puțin mirositoare, fructe roșii sau purpuriu-violete. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Lycium barbarum* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Solanaceae</i>	<i>Lycium barbarum</i> L.	Gărdurariță, Cătină de garduri	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, originar din sud-estul Europei până în vestul Asiei. Portul erect cu ramuri arcuite sau curbate, de regulă cu spini axilari. Frunze oblong-lanceolate la lanceolate, căzătoare toamna, flori roz-deschis sau roz-violet, grupate câte 2-6 pe pedunculi de 8-20 mm. Fructul de până la 2 cm, roșu. Subspontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri, pe garduri, în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Moraceae</i>	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	Maclură	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, originar din America de Nord. Coroană largă, lujeri spinoși, cu spini simpli de 1-2,5 cm. Frunze simple, ovate, cu marginea ăntreagă, cordate la bază, căzătoare toamna. Flori dioice, modeste, fructele sunt compuse, mari de 5-15 cm diametru, verde-gălbui. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Magnolia denudata* Desr.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Magnoliaceae</i>	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	Magnolie	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, uneori rămâne arbustiv, originar din estul și sudul Chinei. Frunze obovate până la alungit obovate, de 10-15 cm lungime și 5-10 cm lățime, verzi închis pe față, palid verzi pe dos. Flori numeroase, erecte, campanulate, albe, parfumate, de 12-15 cm diametru, cu 9 tepale. Fruct brun, cilindric, de 8-12 cm. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Magnolia kobus* DC.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Magnoliaceae</i>	<i>Magnolia kobus</i> DC.	Magnolie	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talia mică, originar din Japonia. Coroana piramidală, frunze lat-ovate la obovate, de 6-17 cm lungime. Flori mari, albe, uneori la exterior cu dungi palid purpurii, apar în martie-mai. Fructe cilindrice, deformate, de 10-12 cm lungime, roșcate. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Magnolia × soulangeana* Soul.-Bod.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Magnoliaceae</i>	<i>Magnolia × soulangeana</i> Soul.-Bod.	Magnolie	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, uneori arbore de talie mică, de origine hibridă. Adesea cu mai multe tulpini de la bază, coroana largă. Frunze obovate până la eliptice de (10)17-20 cm lungime, căzătoare toamna. Flori erecte, campanulate, roz-purpuriu, uneori albe la interior, cu 3 tepale externe mai mici și 6 tepale interne. Fruct cilindric, ușor curbat, roșu. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Magnolia stellata* (Siebold & Zucc.) Maxim.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Magnoliaceae</i>	<i>Magnolia stellata</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	Magnolie stelată	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 3-4 (6) m înălțime, originar din Japonia. Frunze obovate sau îngust eliptice, de 4-10 cm lungime și circa 3-5 cm lățime. Flori albe sau roze, parfumate, cu diametru de circa 8 cm, cu 9-18 tepale, îngust alungite, radiar sau stelat divergente. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Berberidaceae</i>	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2 m înălțime, originar din America de Nord. Frunze imparipenat-compuse, persistente, foliole spinos-dințate, o parte din ele se înroșesc toamna. Flori galbene în inflorescențe erecte, apar în martie. Fructe albastrui, brumate, sferice. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Malus baccata* (L.) Borkh.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Măr siberian	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, uneori rămâne arbustiv, originar din Altai, Amur, nordul Chinei. Coroană rotundă, Frunze ovate, fin și ascuțit serate pe margine, lucitoare. Flori albe, câte 3-8 în corimbe, mari de 3-3,5 cm diametru, fructeglobuloase de 0,8-1 cm, roșii sau galbene, fără caliciu persistent. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Malus domestica* Borkh.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Măr	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, frecvent cultivat la noi, ca pom fructifer. Coroana rotundă, lujerii glabrescenți și frunze mari, tomentoase pe ambele fețe. Flori albe, suflate cu roz, cu diametrul de până la 5 cm. Fruct, variabil, în funcție de soi, ca mărime, formă, culoare; comestibil. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Malus floribunda* Siebold ex Van Houtte**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Malus floribunda</i> Siebold ex Van Houtte	Măr ornamental	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talia mică, uneori arbustiv, originar din Japonia. Ramuri curbate sau larg depărtate, lujerii tineri roșiatici pe partea însorită. Frunze ovate sau eliptice, verzi, căzătoare toamna. Flori numeroase roșii, roz, apar în aprilie. Fructe mici, de 0,6-1,5 cm diametru, roșii, sau galbene pe partea umbrită, roșii pe cea însorită. Cultivat rar în Nădab.	

***Mespilus germanica* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Mespilus germanica</i> L.	Moșmon	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 1,5 - 5 m înălțime, originar din centrul și sudul Europei, Crimeea, Caucaz, Asia Mică și Persia. La noi cultivat pentru fructele sale comestibile, toamna târziu. Lujerii tineri păroși, nespinoși; frunze alterne, eliptice la alungit-lanceolate, de 4-12 cm lungime. Florile albe, de 3-4 cm diametru, fructul , poamă, de 2-3 cm diametru. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Morus alba* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Moraceae</i>	<i>Morus alba</i> L.	Dud, Dud alb, Frăgar	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Florile modeste, fructul, dudu, comestibil, de culoare albă, roză, roșie sau neagră cu gust acrișor, fad, de 1-2,5 cm lungime. A fost mult cultivat la noi, mai ales în alinamente de-a lungul drumurilor, dar și pentru faptul că frunzele sale erau utilizate ca hrană pentru viermii de mătase (<i>Bombyx mori</i>). Este specia cea mai preferată de omida păroasă a dudului (<i>Hyphantria cunea</i>) ca îi roade frunzele. Sălbăticit și cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Paulownia tomentosa* Steud.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	Paulovnia, Arborele prințesei	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talia mijlocie, originar din China. Repede crescător, coroană largă, frunze mari, cordiforme, catifelate (tomentoase). Flori mov deschis, mari, în inflorescențe terminale erecte, de 20-30 cm, apar în mai-iunie. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Philadelphus coronarius* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Hydrangeaceae	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Iasomie, Lămâiță	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, originar din sudul Europei. Prezintă mai multe tulpini de la bază, lujeri erecți viguroși, frunze opuse, ovate la oblong-ovate, de 4-9 cm lungime și 2-4 cm lățime. Flori albe-gălbui, foarte puternic mirositoare, de 2,5-3,5 cm diametru, dispuse în raceme cu câte 5-9 flori, apar în mai-iunie. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Photinia × fraseri* Dress 'Red Robin'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Photinia × fraseri</i> Dress 'Red Robin'	Photinia	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 m înălțime, de origine hibridă, creat în Noua Zeelandă. Coroană compactă, lujeri roșiatici, lucitori, frunze persistente, la început pe lujerii tineri roșiatice, apoi devin verzi. Flori albe mărunte, în inflorescențe corimbiforme, înflorește în mai-iunie, rămân puține fructe neevidente. Se pretează bine la tundere, poate fi folosit sub formă de garduri vii, dar este foarte interesant și izolat. Este sensibil la ger, și iernile aspre ar putea să-l afecteze puternic. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Picea abies* (L.) H.Karst.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	Molid	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, spontan la noi în etajul montan și subalpin. Coroană piramidală, cu vârful întotdeauna ascuțit, ramuri secundare pendule. Frunze aciculare, dispuse radial, rombice în secțiune, ascuțite la vârf, dar neînțepătoare. Conuri mari, pendule. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Picea glauca* (Moench) Voss 'Conica'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss 'Conica'	Molid conic	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de până la 3 m înălțime, specia tipică fiind originară din America de Nord. Coroana conică, compactă, creștere înceată, lăstari foarte subțiri, frunze aciculare, verde-deschis primăvara, mai târziu cu o nuanță ușor albastruie. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Picea omorika* (Pancic) Purk.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea omorika</i> (Pancic) Purk.	Molid sârbesc	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, cu coroana columnar, originar din Serbia și Bosnia-Herțegovina. Se deosebește de alți molizi prin acele aplatizate, ca la brad, lungi de 8-18 mm, verzi închis, lucitoare, cu două dungi albe de stomate pe dos. Ornamental prin cetina sa și prin portul columnar. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Picea pungens* Engelm. 'Argentea'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Molid argintiu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mijlocie-mare, coroană piramidală; specia tipică este originară din America de Nord. Frunze aciculare foarte înțepătoare, dispuse în perie, culoare argintie. Conuri pendente, cu solzi pergamentoși. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Picea pungens* Engelm. 'Glauca Globosa'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Glauca Globosa'	Molid argintiu pitic globulos	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de 1,5-2 m înălțime și 2-3 m lățime. Coroană sferic-lătită, compactă, ace dese, albastre-albicioase tot timpul anului. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Pinus nigra* J.F.Arnold**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold	Pin negru	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talia mare, spontan la noi doar în Banat, fiind originar din Europa, Asia Mică. Coroană larg-ovoidală. Frunze lungi de 15 cm, aciculare, prinse câte 2 în fascicul, persistente. Conuri de culoare deschisă. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Pinus strobus* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus strobus</i> L.	Pin strob, Pin neted	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din America de Nord. Specie repede crescătoare, cu coroană larg-piramidală. Frunze aciculare prinse câte 5 în fascicul, moi, lungi de 10 cm. Conuri pendente, încovoiate, de 8-15 cm lungime, cu stropi de rășină. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Pinus sylvestris L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin silvestru, Pin comun	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talia mare, coroană piramidală, spontan la noi în etajul montan și subalpin. Trunchiul are scoarța cărămizie. Frunze aciculare, prinse câte 2 în fascicul, lungi de 5-7 cm. Conuri erecte. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Platanus acerifolia (Aiton) Willd.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Platanaceae</i>	<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	Platan	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, de origine hibridă. Coroană globuloasă, scoarță marmorată, ce se exfoliază în plăci. Frunze palmat lobate, lobi dințați. Fructe poliachene sferice, pendente, pe același peduncul câte 1-2, mai rar 3. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Platycladus orientalis (L.) Franco

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Cupressaceae</i>	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Biotă, Arborele vieții	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică, coroană piramidală, uneori arbust, originar din centrul și nordul Chinei până în Coreea. Frunze solzoase, alipite de lujeri, persistente, verzi, iarna devin vineții-brune. Conuri mici, ovoidale cu solzii rășfrânți, semințe nearipate. Se pretează bine la tundere, de aceea se cultivă și sub formă de garduri vii. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Platycladus orientalis (L.) Franco 'Aurea Nana'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 'Aurea Nana'	Biotă pitică aurie	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, de talie mică, cu coroană compactă și frunzis solziform, persistent, auriu. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Platycladus orientalis (L.) Franco 'Pyramydalis Aurea'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 'Pyramydalis Aurea'	Biotă aurie	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică, sau arbust, cu coroană piramidală și frunzis solziform, persistent, auriu. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Populus alba L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Plop alb	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan la noi, în zona de câmpie și deal, mai ales în luncile râurilor. Scoarța albă cenușie, mult timp netedă; la bătrânețe formează la bază un ritidom negricios, pietros. Coroană cu ramificații viguroase, neregulate și frunziș bogat, la bătrânețe largă, rărită. Frunze lung pețiolate, diferite ca formă, cele de pe lujeri lungi și cele de pe lăstari sunt mari, 6-12 cm, ovate, cu 3-5 lobi palmați, lat cuneate sau cordate la bază, pe față verzi închis lucitoare, pe dos și pe pețiol alb-tomentoase iar cele de pe lujerii scurți mai mici, ovate, sinuat-dințate, pe dos cenușii-tomentoase. Flori neînsemnate, semințele în schimb, produc neplăceri datorită pufului care le însoțește. Spontan în lunca Crișului Alb, cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Populus × canadensis* Moench**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Salicaceae	<i>Populus × canadensis</i> Moench	Plop euroamerican	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, de origine hibridă. Lujerii sunt viguroși, obișnuit muchiați, glabri sau dispers păroși, cu cicatrici mari trilobate. Muguri asemănători cu cei de la plopul negru, dar puțin mai mari. Frunze cu forme și mărimi variabile, în general deltoide, pe margini ciliate în tinerețe, cu 1-2 glande roșiatice la baza limbului. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Populus nigra* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Plop negru	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, la noi spontan la câmpie și deal, în zona de luncă. Tulpina este dreaptă, lemnul moale; lujerii sunt rotunzi, netezi sau ușor striati, glabri, lucitori, galben-verzui sau galben-bruni. Muguri alterni, alungit-conici, oarecum fuziformi și ușor curbați, de culoarea lujerului, alipiți de lujer și cu vârful puțin depărtat. Frunze rombico-ovate, triunghiulare, 5-10 cm, prelung acuminate, crenat-serate, glabre, cu un pețiol de 6 cm, turtit și fără glande. Flori modeste, fructele sunt capsule pedicelate, mai mari decât la plopul alb, ce se coc prin mai, iar semințele sunt mici, egretate. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Populus nigra* L. 'Italica'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	Plop negru piramidal	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, coroană fastigiată. Este cultivar numai cu exemplare masculine, care nu produc puf. Frunze triunghiulare și romboidale, galbene toamna. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus avium* (L.) L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Cireș	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, spontan la noi, cultivat pentru fructele sale. Scoarța exfoliabilă în fâșii circulare, coroana piramidal-ovoidă, cu ramuri lungi. Lujeri viguroși, glabri, cenușii sau roșcați, lucitori, acoperiți de o pieleță exfoliabilă. Frunze de 8-15 cm, eliptic-obovate, acuminate, dublu serate, glabre, la baza limbului pe pețiol cu 1-2 glande roșcate. Flori albe, 2-4 cm, câte 3-6 grupate în fascicule umbelate, înfloresc în aprilie-mai înainte sau odată cu înfrunzirea. Fructul este o drupă globuloasă, 1-2 cm, roșie-negricioasă. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus armeniaca* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Cais	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, frecvent cultivat la noi ca pom fructifer, originar din vestul Asiei. Coroană globuloasă, lujeri viguroși, lucitori, frunze lat-ovate sau orbicular-ovate, de 5-10 cm lungime, cu baza subcordată, sau rotunjită, căzătoare toamna. Flori, de regulă solitare, albe sau roz-deschis, de 2,5 cm diametru, înfloresc în aprilie. Fructul comestibil, globulos de 3 cm diametru sau mai mare, în funcție de soi, gălbui cu tentă roșcată. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus cerasifera* Ehrh.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Corcoduș	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios de talie mică, uneori arbust, spontan în sudul și vestul țării, la câmpie și coline, în rest subspontan și cultivat. Tulpină scurtă neregulată. Scoarța cenușie lucitoare, netedă. Lujeri subțiri, verzi sau roșii, lucitori, cei laterali terminați în spini. Frunze de 2-7 cm, eliptic-ovate, serate, glabre. Flori albe, solitare sau câte două, de 2 cm, apar odată cu înfrunzirea. Fructele globuloase, 2-3 cm, galbene sau roșii-brune, se coc în iulie. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Prunus cerasifera* Ehrh. 'Pissardii'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii'	Corcoduș roșu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore de talie mică, coroană etalată. Frunze ovate, purpurii. Flori roz, apar în martie. Fructe roșii, greu vizibile în coroană. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus cerasus* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> L.	Vișin	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, cultivat frecvent ca pom fructifer, originar din vestul Asiei și centrul Europei. Coroană globuloasă, cu ramuri adesea pendente. Frunze eliptic-ovate până la ovate, de 5-8 cm lungime, căzătoare toamna. Flori albe sau roz, apar după înfrunzire. Fruct globulos, turtit, comprimat la vârf, lung pedunculat, comestibil, acrișor. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus domestica* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.	Prun	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, foarte frecvent cultivat la noi în țară, pentru fructele sale, este originar din Caucaz. Frunze eliptice sau obovate, de 5-10 cm lungime, dur crenat-serate pe margine, căzătoare toamna. Flori alb-verzui, de 1,5-2 cm diametru, apar înaintea frunzelor. Fruct divers, în funcție de soi, comestibil, foarte apreciat, cu diferite utilizări. Este o specie preferată de omida păroasă a dudului (<i>Hyphantria cunea</i>) care îi roade frunzele. Cultivat foarte frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb.	Migdal	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore de până la 8 m, cultivat la noi pentru sămburii săi, originar din Asia. Ramuri drepte, fără spini, frunze oblong-lanceolate, de 4-12 cm lungime și 1,2-3 cm lățime. Flori sesile, în perechi, apar înainte de înfrunzire, roz în boboc, apoi roz-pal până la albe. Sămburii sunt dulci sau amari. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Prunus laurocerasus* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurocireș	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 5 m înălțime, originar din sud-estul Europei și Asia Mică. Lujeri verzi, glabri. Frunzele sunt persistente, groase, obovate până la îngust eliptice, 8-15 cm, întregi sau fin serate, pielioase. Flori albe, odorante, grupate în raceme de 10-12 cm, înguste și erecte. Fructul este ovoid, 1 cm, negricios albăstrui, lucios. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Prunus mahaleb* L**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> L	Vișin turcesc	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust sau arbore foios, de până la 8m înălțime, spontan la noi în Banat, Dobrogea, sudul Moldovei. Tulpina este scurtă, coroana este rară, globuloasă. Lujeri subțiri, cilindrici, măslinii, acoperiți cu o pieleță cenușie, la zdrelire cu miros aromat. Frunze de 2-5 cm, rotund-ovate, scurt-acuminate, fin serate, glabre. Flori albe, 1,5 cm, grupate câte 4-12 în corimbe sau raceme erecte; înfloarește în aprilie, odată cu înfrunzirea. Fructe globuloase, negre, 6-10 mm, amăru, comestibile. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Prunus persica* (L.) Batsch**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Piersic	Arbust / arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust sau arbore foios, de până la 6 m înălțime, cultivat ca pom fructifer, originar din centrul și nordul Chinei. Ramuri drepte, fără spini, frunze oblong-lanceolate, de 7-15 cm lungime și 2-4 cm lățime. Flori solitare, aproape sesile, apar înainte de înfrunzire, roz-intens. Fruct subglobulos, de 4-8 cm diametru, succulente, foarte gustoase. Este un arbore nu foarte trainic. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus persica* (L.) Batsch 'Purpurea'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 'Purpurea'	Piersic roșu	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, cu frunze roșii-purpurii și flori simple roz. Cultivat rar în Nădab.	

***Prunus serrulata* Lindl.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Cireș japonez	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, uneori arbust, originar din Japonia și China. Formele ornamentale cultivate sunt, în general, cu flori duble și se înmulțesc prin altoire pe cireș sălbatic, care adesea are tendința de a elimina altoiul. Frunze ovate până la ovat-lanceolate, dublu serate pe margine, toamna se colorează în diferite nuanțe de galben-portocaliu. Flori, adesea duble, roz, sterile. Cultivat sporadic în centrul orașului Chișineu-Criș.	

***Prunus spinosa* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus spinosa</i> L.	Porumbar	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2-3 m înălțime, spinos, sub formă de tufă deasă, spontan la noi în țară. Lujerii cenușii, pubescenti, cei laterali terminați în spin. Frunze eliptice, caduce, 2-4 cm, cuneate, crenat-serate, pe dos pubescente. Flori albe, pe tip 5, solitare, 1-2 cm, apar înaintea înfrunzirii. Fructele sunt globuloase, 1-1,5 cm, negre, albastrui-brumate, se păstrează până primăvara pe ramuri. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri, în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Prunus triloba* Lindl.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus triloba</i> Lindl.	Cireș japonez pitic	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 5 m înălțime, originar din China. Frunze trilobate la vârf, flori adesea duble, sterile de culoare roz, înfloreste înainte de înfrunzire. Se înmulțește prin altoire pe corcoduș. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco var. <i>menziesii</i>	Douglas verde	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar în vestul Americii de Nord. Coroană piramidală, tulpina dreaptă, cilindrică, cu elagaj greoi. Scoarță cenușie închis, mult timp netedă, cu puni de rășină; Ace liniar turtite, de 2-3 cm, moi, pe față verzi lucitori, pe dos cu 2 dungi albicioase de stomate, ascuțite, neînțepătoare; la strivire emană un miros aromat caracteristic. Flori neevidente. Conurile sunt pendente ovoid-cilindrice, scurt pedunculate, cu solzi rotunjiți întregi și bractei prevăzute cu 3 vârfuri în lungul conului. Coroană piramidală. Frunze aciculare moi, miros de citrice la strivire. Conuri pendule cu bractei lungi. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	<i>Pinaceae</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco var. <i>glauca</i> (Beissn.) Franco	Duglas brumăriu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore răsinos, de talie mare, originar din America de Nord, în Munții Stâncosi, unde este adaptată la climate mai aspre. Coroana mai compactă, acele relativ mai scurte, rigide, verzi-albăstrui, conuri mai mici, 5-6 cm, cu bractei tot trifidate dar răsfrânte spre baza conului. Cultivat rar în Nădab.	

***Pyracantha coccinea* M. Roem.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Piracanta	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-3 m înălțime, cu ramuri spinoase, originar din Italia până în vestul Chinei. Frunze lanceolate, lucioase, persistente. Flori albe în inflorescențe, apar în mai-iunie. Fructe sferice, portocalii. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Pyrus communis* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Pyrus communis</i> L.	Păr	Arbore / pom fructifer
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, cultivat adesea ca pom fructifer, de origine hibridă. Coroană piramidală, lujeri nespinoși, frunze ovate, subrotunde și eliptice, crenat-serate sau întregi, lucioase, căzătoare toamna. Flori albe-rozii, grupate în corimbe sau umbele. Fructe mari, comestibile. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Quercus cerris L.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus cerris</i> L.	Cer	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mare, spontan la noi, în stațiuni cu soluri argiloase. Tulpina cilindrică, cu scoarța cu ritidom gros, pietros, negricios, cu fundul crăpăturilor roșu-cărmiziu. Coroana îngustă, cu ramuri concentrate spre vârf, are frunziș bogat. Lujerii sunt cenușii sau brun-verzui, tomentoși, muchiați. Frunze eliptice până la oblong-lanceolate, 5-15 cm, pielose pe fața superioară, verde închis, pe dos cenușiu sau gălbui pubescent, marcescente. Ghindele sunt sesile sau scurt pedunculate, de 4-5 cm. Maturația în anul al doilea. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.		

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Gorun	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mare, spontan la noi în etajul deluros. Tulpină cilindrică, scoarța formează un ritidom relativ subțire, cenușiu-negricios, lemnul extrem de valoros. Frunze de 8-16 cm, rombic-obovate, variabile, cuneate, la vârf îngustate, pețiol de 1-2,5 cm, scurt lobate până la fidat lobate, cu 5-8 perechi de lobi rotunjiți, glabre, marcescente. Ghindele sunt lățit ovoide, în formă de butoiș, 15-25 mm, grupate câte 1-5 aproape sesile. Maturația este anuală. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.		

Quercus robur L.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus robur</i> L.	Stejar, Stejar pedunculat	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mare, spontan în zona de câmpie. Tulpina nu este așa de dreaptă, scoarța formează un ritidom negricios, tare, pietros, larg și adânc crăpat longitudinal și transversal. Lemnul este valoros. Coroana este largă, neregulat întreruptă, cu ramuri puternice, noduroase, evident întinse orizontal. Frunze de 6-20 cm, variabile, obovate sau oblong-obovate, cu lățimea maximă în treimea superioară, la vârf rotunjite, la bază îngustate și auriculate, scurt pețiolate, glabre pe ambele fețe, la maturitate oarecum pielose, marcescente. Ghindele stau câte 2-5 pe un peduncul lung; ghinda are 2-4 cm, este ovoid-alungită, brună-gălbuie, cu câteva dungi longitudinale întunecate. Maturația anuală. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.		


Quercus robur L. 'Fastigiata'

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Stejar columnar	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, cu ramuri erecte și coroana fastigiată sau îngust-piramidală. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Quercus rubra L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus rubra</i> L.	Stejar roșu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, originar din estul Americii de Nord. Tulpină dreaptă, cilindrică, scoarța cenușiu-verzuie, mult timp netedă și subțire, spre maturitate formează crăpături distanțate. Lemnul inferior în raport cu stejarul sau gorunul. Coroană mare, cu frunziș bogat, iar lujerii sunt roșii-bruni, lucitori, muchiați, cu lenticile gălbui. Frunze de 11-22 cm, lobate, cu lobii adânciți până la mijlocul jumătății limbului, scurt și neregulat lobulați și terminați cu vârfuri prelungite; pe față sunt verzi închise; toamna devin pielose și se colorează în galben apoi în roșu, foarte decorative. Ghindele sunt scurt pedunculate, lat ovoide, de 2 cm. Maturația este bienală. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Rhamnus cathartica L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rhamnaceae</i>	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spinul cerbului, Voniceriu	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 3 (6) m înălțime, spontan în zona de câmpie și deal. Lujeri cenușii, glabri, lucitori, prevăzuți cu lenticile rare, adesea terminați într-un spin ce înlocuiește mugurele terminal. Frunze variabile, de 4-8 cm, ovat-eliptice, crenat-serate, glabre. Flori poligame sau dioice, pe tipul 4, verzi-gălbui, grupate câte 2-5 în fascicule ce apar în mai-iunie. Fructele sunt drupe negre, 6 mm, cu 2-3 sâmburi. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Rhus typhina L.

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Anacardiaceae	<i>Rhus typhina</i> L.	Oțetar	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust de talie mare sau mic arbore, originar din America de Nord. Frunze imparipenat compuse, mari, toamna roșii. Flori nesemnificative. Fructe roșii, persistă pe lăstari după căderea frunzelor. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Rhus typhina L. 'Dissecta'

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Anacardiaceae	<i>Rhus typhina</i> L. 'Dissecta'	Oțetar laciniat	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, cu frunze imparipenat compuse cu foliolele sectate. Aspectul de toamnă al acestui cultivar este diferit față de specia tip, frunzișul colorându-se în nuanțe de oranj. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Ribes aureum Pursh

Subîncrângătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Grossulariaceae	<i>Ribes aureum</i> Pursh	Coacăz auriu, Cuișor	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 2 m înălțime, originar din America de Nord până în Mexic. Lujerii sunt lucitori, nu se exfoliază, iar mugurii sunt alipiți de lujer, bruni, fin păroși. Frunzele sunt mici (3-5 cm) trilobate, lung pețiolate. Florile au caliciul alungit, sepale aurii, petale roșii, fiind grupate în raceme de câte 7-15, plăcut mirositoare. Bacele sunt negre-purpurii, lucioase, lunguiețe. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Ribes nigrum* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes nigrum</i> L.	Coacăz negru	Arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbust foios, de 2 m înălțime, cu tulpini viguroase, erecte, negricioase, spontan la noi în etajul deluros și montan. Lujeri cenușiu-gălbui, cu scoarță ce se exfoliază în partea inferioară; au miros neplăcut. Frunze subrotunde, cordiforme, 5-10 cm, cu 3-5 lobi triunghiulari dublu serați. Flori hermafrodite, mari, campanulate, câte 6-12 în raceme; înfloarește odată cu înfrunzirea, prin aprilie. Fructele sunt bace sferice negre cu puncte galbene; se coc treptat în iunie-iulie, comestibile. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Robinia pseudoacacia* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Salcâm	Arbore
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios de talie mare, originar din America de Nord. Tulpina dreaptă, scoarță la început netedă, ulterior formează un ritidom gros, cu crăpături longitudinale adânci. Coroana este neregulată, rară. Lujeri muchiați, măslinii până la brun-roșcați, cu spini de o parte și de alta a mugurilor, spini proveniți din transformarea stipelelor. Frunze imparipenat-compuse, cu 7-19 foliole eliptice, de 3-5 cm, întregi. Flori albe, cu simetrie bilaterală, grupate în raceme pendente de 10-25 cm, puternic și plăcut mirositoare; înfloarește după înfrunzire, în mai-iunie. Fructele sunt păstăi dehiscente, 5-10 cm, cu 3-10 semințe negricioase. Sălbăticit și cultivat foarte frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.		

***Robinia pseudoacacia* L. 'Bessoniana'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. 'Bessoniana'	Salcâm globulos	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu	Imagine de detaliu	Descriere		
		Arbore foios, de talie mică, înmulțit prin altoire pe salcâm tipic. Coroană laxă, sferic-ovoidală. Ramuri aproape complet nespinoase. Înfloarește foarte rar. Cultivat rar în Chișineu-Criș.		

***Robinia pseudoacacia* L. 'Umbraculifera'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. 'Umbraculifera'	Salcâm umbrelă	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, adesea arbust nedepășind 4-5 m. Se înmulțește prin altoire pe salcâm tipic. Coroană subglobuloasă, deasă, cu mulți lujeri nespinoși. Frunze mai mici, verde deschis. Înflorește rar. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Robinia viscosa* Vent.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia viscosa</i> Vent.	Salcâm roșu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, originar din America de Nord. Coroană rară, lujeri fără spini, glandulos-vâscoși și frunze imparipenat compuse, cu pețiol întunecat, glandulos, cu 13-25 foliole. Flori violet-roze, nemirositoare, grupate câte 6-16 în raceme pendente ce apar prin mai-iunie. Fructele sunt păstăi glandulos păroase. Cultivat rar în Chișineu și Nădab.	

***Rosa canina* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa canina</i> L.	Măceș	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-3 m înălțime, spontan, cu tulpini și ramuri ce au ghimpi recurbați. Frunze stipelate, imparipenat compuse, cu 7 foliole ovat-eliptice, întregi, de 2-4 cm, serate, glabre, căzătoare toamna. Flori roze sau albe, de 3-5 cm, câte 1-3 dispuse terminal, cu 5 sepale spintecate, rășfrânte după înflorire, 5 petale și receptacul neglandulos. Fructele sunt de tipul poliachenei false, numite măceșe. Spontan în Lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Rosa rugosa* Thunb.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Trandafir chinezesc	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 1-1,5 m înălțime, originar din Asia de Est. Tulpinile și ramurile sunt foarte ghimpoase, cu ghimpi mari, drepți și cu aciculi păroși. Frunze imparipenat compuse, cu 5-9 foliole mari, groase, rigide, pe dos suriu păroase cu glande lucioase. Flori mari, 8-9 cm, roșii. Fructe mari, 2-3 cm, globuloase, roșii-portocalii, glabre. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Salix alba* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix alba</i> L.	Salcie albă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, spontan la noi în Lunca și Delta Dunării, dar și în luncile râurilor interioare. Tulpina este obișnuit strâmbă. Lemnul este moale, coroana este rară, neregulat ramificată, lujerii zvelți, flexibili, verzi-gălbui sau bruni. Frunze lanceolate, 4-10 cm, prelung acuminate sau acute, cuneate, mărunț serate. Fructele sunt capsule ce se coc prin mai-iunie, semințele sunt mici, prevăzute cu puf. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor și cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix babylonica* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i> L.	Salcie pletoasă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică-mijlocie, originar din Asia. Lujeri foarte lungi, flexibili, gălbui, glabri, lucitori, pendenți; în tinerețe lujerii pot fi spre vârf slab pubescenti. Frunze lanceolate, 8-16 cm, acuminate, cuneate, fin serate, pe dos verzi-cenușii, glabre. Amenții apar odată cu frunzele, florile masculine au două stamine și două glande nectarifere, iar cele femele numai o glandă nectariferă. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix caprea* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix caprea</i> L.	Salcie căprească	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios sau arbore de până la 9-10 m înălțime, spontan la deal și munte. Coroană rară, tulpina este obișnuit strâmbă, lujerii sunt groși, verzui-roșcați până la roșii-purpurii. Muguri alterni, cei foliacei ovo-conici, roșcați, cei floriferi mai mari, ovoid-globuloși. Frunze lat-eliptice, 4-12 cm, groase, acute. Amenții erecti, apar devreme înaintea frunzelor prin martie-aprilie, cei masculi elipsoidali, 2-3 cm, cei femeli de 6-10 cm. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix caprea* L. 'Pendula'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix caprea</i> L. 'Pendula'	Salcie căprească plângătoare	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, înmulțit frecvent prin altoire. Creștere înceată, ramuri dese, scurte, pendente, destul de rigide. Sunt cunoscuți numai indivizi femeli. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix cinerea* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix cinerea</i> L.	Zălog	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 3-6 m înălțime, spontan în luncile râurilor. Lujerii sunt cenușii-bruni, viguroși, cu muchii longitudinale, rămânând până în anul al III-lea scurt și cenușiu catifelat-tomentoși. Muguri alterni, ovoizi, scurt și cenușiu-tomentoși. Frunze obovat-lanceolate, 5-10 cm, acute sau scurt acuminate, cuneate sau slab rotunjite, pe margini neregulat crenat sau scurt dințate, în tinerețe tomentoase pe ambele fețe, apoi verzi-închis, pe dos se păstrează cenușiu-pubescente sau tomentoase. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Salix fragilis* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix fragilis</i> L.	Salcie plesnitoare	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, spontan din Delta Dunării până în regiunea montană. Lujerii sunt flexibili, verzui până la brun-verzui, glabri lucitori și plesnesc ușor de la locul de inserție. oblong-lanceolate, 6-16 cm, prelung acuminate, lat cuneate, mărunț glandulos-serate; pe pețiol, la baza limbului sunt două glande proeminente. Înfloarește înainte de înfrunzire. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix integra* Thunb. 'Hakuro-nishiki'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix integra</i> Thunb. 'Hakuro-nishiki'	Salcie flamingo	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 3-5 m înălțime, specia tipică fiind originară din Japonia și Coreea. Lujeri flexibili, frunze aproape opuse, cele tinere din vârful lujerilor albicioș-roșiatice, cele mature verzi-albicioase. Foarte decorativă, se înmulțește adesea prin altoire. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Salix matsudana* Koidz. 'Tortuosa'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	Salcie creță	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, originar din China și Coreea. Lujeri glabri, galbei sau verzi măslini, frunze îngust-lanceolate, de 5-8 cm lungime. Atât ramurile, cât și lujerii și frunzele sunt torsionate, răsucite. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Salix viminalis* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Răchită	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, mai rar arbore de până la 8 m înălțime, spontan la câmpie și deal, în luncile râurilor. Lujerii lungi, erecti, foarte flexibili, verzi sau brun-gălbui, cenușiu-pubescenti la început. Frunze liniar-lanceolate, 8-15 cm, cu lățimea maximă în jumătatea inferioară. Amenții apar înaintea înfrunzirii. Spontan în lunca Crișului Alb și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Sambucus nigra* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Soc negru	Arbust / arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, foarte rar arbore de talie mică, spontan din zona de câmpie până în etajul montan inferior. Tulpină neregulată sau încovoiată, adesea de la bază formează numeroase ramuri lungi, drepte. Lujeri groși, verzi-cenușii, cu măduva largă, spongioasă, albă. Frunze imparipenat compuse, cu 3-5 foliole eliptice, serate, pe dos păroase în lungul nervurilor. Flori albe, grupate în cime umbeliforme plane, terminale, cu diametrul de 12-20 cm, puternic mirositoare; apar în mai-iunie, după înfrunzire. Fructele sunt drupe baciforme sferice, negre, 6-8 mm, se coc prin septembrie. Spontan în lunca Crișului Alb, pe marginea canalelor, prin tufărișuri și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Spiraea × bumalda* Burv.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Spiraea × bumalda</i> Burv.	Cununiță cu flori roz	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de talie mică, sub 1 m, de origine hibridă. Frunze lanceolate. Flori roz, mici, în inflorescențe aplatizate, apar din mai până în iulie. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	



Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rosaceae	<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zabel	Cununiță	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-3 m înălțime, de origine hibridă. Frunze romboidale. Flori mici, albe, în inflorescențe emisferice, apar în mai. Poate fi cu succes cultivat sub formă de garduri vii, deoarece se pretează bine la tundere. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Styphnolobium japonicum (L.) Schott

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Fabaceae	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Salcâm japonez	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, coroană largă, originar din Japonia, China și Coreea de Nord. Frunze imparipenat compuse. Flori galben deschis, mici, în inflorescențe erecte, apar în iulie. Fructele sunt păstăi cărnoase, verzi. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Hurmuz, Cărmâz	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 1-2 m înălțime, originar din America de Nord. Lujerii sunt subțiri, cenușii, fistuloși, glabri. Frunze variabile, de 2-5 cm, rotunjit-eliptice, întregi sau neregulat lobate, pubescente pe dos. Flori mici, grupate în raceme întrerupte, alb-roze. Fructele sunt bace globuloase, de circa 1 cm, albe, se păstrează pe lujer și în timpul iernii. Cultivat rar, mai ales sub formă de garduri vii, în Chișineu-Criș.	

Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Oleaceae	<i>Syringa josikaea</i> J.Jacq. ex Rchb.f.	Liliac transilvănean	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 4 m înălțime, spontan în Munții Apuseni. Tulpini și ramuri mai groase, îndreptate în sus, lujeri tineri păroși, cu un singur mugure terminal, frunze la bază rotunjite sau brusc îngustate, cu margine scurt ciliată, pe dos albicios glaucescente, uneori pe nervuri rar păroase și cu pețiol scurt de 1 cm, flori mai slab mirositoare, grupate în panicule mici și înguste, cu puține flori, purpurii-violacei, capsule ovoide, ascuțite la vârf. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

Syringa vulgaris L.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Oleaceae	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Liliac, Iorgovan	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 6 m înălțime, spontan în Banat, Oltenia și Dobrogea, foarte frecvent cultivat pentru florile sale. Lujerii viguroși, măslinii, glabri, terminați la vârf cu doi muguri. Frunze de 6-12 cm, ovate cordiforme, acuminate, verzi închise și cu pețiol de 2-3 cm. Flori violet sau albe, plăcut mirositoare, grupate în panicule dese de 10-20 cm; apar prin mai. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Tamarix ramosissima Ledeb.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Tamaricaceae	<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Cătină roșie	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de până la 4 m înălțime, spontan la noi, în sudul și estul țării. Lujeri subțiri, rotunzi, frunze solziforme, 2-3 mm, glauce, ovoid-lanceolate, ascuțite, sesile. Flori mici, roz sau albe, slab mirositoare, grupate în raceme spiciforme formate pe lujerii din anul curent; apar în mai-iunie. Fructele sunt capsule. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	


***Taxodium distichum* (L.) Rich.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Chiparos de baltă	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din America de Nord. În rădăcinarea este trasantă atunci când crește în condiții normale din regiunile inundabile, și dezvoltă pneumatofori, și pivotantă în soluri fără exces de apă. Tulpină dreaptă, coroană rară, luminoasă, larg-piramidală. Lujerii sunt unii persistenți, bruni lucitori, glabri, cu muguri, ce poartă frunze mici solzoase, așezate spiralat, și alții căzători, subțiri, verzi, fără muguri, cu frunze liniare, subțiri, verzi, dispuse pectinat și care toamna se înroșesc și cad împreună cu lujerii. Conuri aproape sferice, 2-3 cm. Maturarea este anuală. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Taxus baccata* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L.	Tisă	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mică, spontan în etajul montan. Coroana la arborii izolați este larg piramidală. Lujerii sunt verzi deschis-gălbui, frunze acicular-lățite, persistente, pielose, de 3 cm, acuminat, ascuțite dar neînțepătoare. Flori unisexuat dioice. Semințele sunt de tip galbulus, de 1 cm, ovoide, cu tegumentul lemnos acoperit până aproape de vârf cu un aril roșu cărnos, brumat, comestibil. Scoarța, lujerii și frunzele conțin taxină, care este toxică. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Tetradium daniellii* (Benn.) T.G.Hartley**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Rutaceae	<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T.G.Hartley	Evodie, Arborele de miere	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mică, originar din nordul Chinei, Coreea. Frunze imparipenat compuse, cu 7-11 foliole, flori mici în inflorescențe foarte mari, înfloresc în mai-iulie și sunt melifere. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Thuja occidentalis* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Tuie	Arbore / arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talia mijlocie sau mică, uneori rămâne arbust, originar din America de Nord. Coroană îngust-piramidală. Frunze solzoase, mici. Conuri ovoidale, mici. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Thuja occidentalis* L. 'Danica'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Danica'	Tuia globuloasă pitică	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust rășinos, sub 1 m înălțime, cu creștere încetă, frunze solziforme, lujeri orientați pe verticală și coroană sferică. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Thuja plicata* Donn ex D.Don**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don	Tuie gigantică	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, de talie mare, originar din vestul America de Nord. Tulpina dreaptă, coroana conică ascuțită, scoarța este netedă, brun-roșcată, cu un ritidom timpuriu, exfoliabil în fâșii late longitudinale. Lujeri principali sunt aproape rotunzi, cei terminali turtiți; ramificațiile de același ordin se dispun paralel. Frunze solziforme, opuse, verzi și peste iarnă, lucitoare, fără glande rezinifere convexe, pe dos cu 2 dungi de stomate albastrui. Conuri de până la 2 cm lungime. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Thuja plicata* Donn ex D.Don 'Aurea'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don 'Aurea'	Tuie gigantică aurie	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, cu creștere mai înceată decât specia tipică, cu frunze de pe vârful lujerilor galbene-aurii. Cultivat foarte rar în Chișineu-Criș.	

***Thuja plicata* Donn ex D.Don 'Zebrina'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don 'Zebrina'	Tuie gigantică variegată	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore rășinos, cu creștere mai înceată decât specia tipică, cu frunzele striate cu galben. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Tilia cordata* Mill.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Tiliaceae	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tei pucios, Tei cu frunza mică	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mijlocie, spontan. Tulpina dreaptă, scoartă cenușie, netedă la început, apoi cu un ritidom îngust crăpat longitudinal. Coroană ovoid-conică, deasă, cu lujeri verzi-măslinii până la roșcați, glabri, lucitori. Muguri alterni, ovoizi, prevăzuți cu 2 solzi. Frunze mai mici decât la celelalte specii de tei, de 3-6 cm, subrotund-cordate, acuminate, serate, pe dos verzui-albăstrui cu smocuri de peri ruginii în axila nervurilor. Flori mici, galbene, cu 15-40 stamine, mai puțin mirositoare decât la teiul cu frunza mare, grupate în cime de câte 3-16. Înflorește în iunie-iulie, cu 2 săptămâni mai târziu decât teiul cu frunza mare. Fructele sunt achene ovoide de 4-6 mm, cu 5 coaste puțin proeminente și pereți subțiri piełoși. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

Tilia platyphyllos Scop.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Tiliaceae</i>	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tei cu frunza mare	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan. Lujeri mai viguroși, la început pubescenti, roșii-purpurii, muguri mai mari, cu 3 solzi, frunze mai mari, 6-12 cm, obișnuit asimetrice, pe dos relativ pubescente, cu smocuri de peri albicioși în axila nervurilor și pețiol pubescent; înfrunzește și înfloarește cu 2 săptămâni mai devreme, flori mai mari, cu 15-40 stamine, fără staminodii și grupate câte 3-9 în cime; sunt mai mirositoare și mai bogate în nectar, fructe mai mari decât la ceilalți tei, de 8-10 mm, tomentoase, cu 5 coaste proeminente și nu se sparg între degete; creșterile sunt mai active, iar longevitatea mai mare. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Tilia tomentosa Moench

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Tiliaceae</i>	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Tei argintiu	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan. Scoarța este cenușie, mult timp netedă, la bătrânețe formând un ritidom subțire, superficial brăzdat. Coroană foarte deasă, umbroasă, cu colorit argintiu. Lujeri verzi cenușii, tomentoși, cu peri stelați. Muguri alterni, ovoizi, cu 2 solzi aproape egali. Frunze cordiforme, de 7-13 cm, pe dos cenușii-argintii-tomentoase, cu peri stelați; flori grupate câte 5-10. Fructele sunt achene mai mari, stelat-tomentoase, tari, lemnoase, cu 5 coaste puțin evidente. Cultivat frecvent în Chișineu-Criș și Nădab.	

Ulmus laevis Pall.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Velniș, Vânj	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan. Tulpina dreaptă, la bază cu muchii evidente. Muguri alterni, dispuși distic, conici-fusiformi, ascuțiți, până la 1 cm, cu solzi bruni-deschis pe margine cu o dungă lată brun-închisă, neciliați. Frunze 6-14 cm, eliptic-ovate, acuminate, pronunțat asimetrice la bază, dublu serate, scurt pețiolate (4-6 mm), pe dos pubescente. Fructele sunt samare turtite, ovate sau rotunde, de circa 1 cm, la vârf adânc crestate, pe margini ciliate, lung și inegal pedunculate și pendente. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

***Ulmus minor* Mill.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulm de câmp	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mare, spontan. Tulpina dreaptă, coroana ovoid-alungită în tinerețe și globuloasă la maturitate, cu ramuri ascendente. Frunze de 5-9 cm, eliptice până la obovate, acuminate, evident asimetrice la bază, dublu serate, cu pețiol relativ lung. Fructele sunt samare turtite, eliptice-obovate, 1,5-2 cm, cu vârful aripioarei divizat, sămânța fiind plasată excentric spre vârf. Maturația este timpurie (mai-iunie). Spontan în lunca Crișului Alb și cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Ulmus pumila* L. 'Turkestan'**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus pumila</i> L. 'Turkestan'	Ulm de Turkestan	Arbore
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbore foios, de talie mica, originar din Extremul Orient, Siberia Orientală, Mongolia, Asia Centrală, nordul Chinei. Tulpina este ramificată de la bază, scoarța cenușie, cu crăpături adânci, iar coroana bogată, des și regulat ramificată. Frunze eliptice sau eliptic-lanceolate, acuminate, simetrice la bază, imperfect dublu serate, lungi de 2-7 cm, cu pețiol scurt (2-4 mm), glabre, cu aspect pielos. Fructele sunt samare orbiculare, de 1-1,5 cm, la vârf adânc și larg crestate, cu sămânța centrală. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Viburnum opulus* L.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Viburnum opulus</i> L.	Călin	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 2-4 m înălțime, spontan de la câmpie la munte. Lujeri fragili, curbați neregulat, muchiați, gălbui-roșiatici, lucitori, glabri, cu măduva largă. Frunze trilobate, de 4-12 cm, cu lobi acuminați, adânc dințați, la bază trunchiate sau rotunjite, glabre, netede. Flori albe-verzui, grupate în cime terminale de 5-7 cm, cele din mijlocul inflorescenței mai mici și fertile, iar cele de pe margini cu petale albe, mai mari și sterile; apar prin iunie. Fructe roșii. Cultivat rar în Chișineu-Criș și Nădab.	

Weigela florida (Bunge) A.DC.

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Caprifoliaceae	<i>Weigela florida</i> (Bunge) A.DC.	Weigela	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust foios, de 3 m înălțime, originar din China, Coreea. Frunze oval-acuminate. Flori roz, mari, apar în mai-iunie. Cultivat rar în Chișineu-Criș.	

Wisteria sinensis (Sims) Sweet

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Fabaceae	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	Glicină	Liană
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Liană lemnoasă volubilă, viguroasă, originară din China și Japonia. Frunze imparipenat compuse. Flori mov, în inflorescențe pendule, apar în mai. Cultivată sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	

***Yucca* spp.**

Subîncręgătura	Familia	Denumirea științifică	Denumirea populară	Categoria
Angiospermae	Asparagaceae	<i>Yucca</i> spp.	luca	Arbust
Imagine de ansamblu		Imagine de detaliu	Descriere	
			Arbust de talie mică, tulpinile florifere ajungând și la 1,5m, originar din America de Nord. Frunze persistente, liniar-lanceolate, lungi, rigide, ascuțite la vârf, înțepătoare. Flori mari, albe, în inflorescențe mari erecte, apar în iulie. Cultivat sporadic în Chișineu-Criș și Nădab.	